

Os comentários devem ser consultados.

VACINAS COVID-19 – Acesse os dados atualizados sobre a disponibilidade de vacinas e os grupos contemplados pelo PNI em: sbim.org.br/covid-19

| Vacinas | Esquemas e recomendações | Comentários | DISPONIBILIZAÇÃO DAS VACINAS | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|------------------------------------|---|--|---|--|---|--|---|--|--|----------------|----------------------|
| | | | Gratuitas nas UBS* | Clínicas privadas de vacinação | | | | | | | | | | |
| RECOMENDADAS | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Histórico vacinal</th> <th>Conduta na gestação</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Previamente vacinada, com pelo menos três doses de vacina contendo o componente tetânico.</td> <td>Uma dose de dTpa a partir da 20ª semana de gestação.</td> </tr> <tr> <td>Em gestantes com vacinação incompleta tendo recebido uma dose de vacina contendo o componente tetânico.</td> <td>Uma dose de dT e uma dose de dTpa, sendo que a dTpa deve ser aplicada a partir da 20ª semana de gestação. Respeitar intervalo mínimo de um mês entre elas.</td> </tr> <tr> <td>Em gestantes com vacinação incompleta tendo recebido duas doses de vacina contendo o componente tetânico.</td> <td>Uma dose de dTpa a partir da 20ª semana de gestação.</td> </tr> <tr> <td>Em gestantes não vacinadas e/ou histórico vacinal desconhecido.</td> <td>Duas doses de dT e uma dose de dTpa, sendo que a dTpa deve ser aplicada a partir da 20ª semana de gestação. Respeitar intervalo mínimo de um mês entre elas.</td> </tr> </tbody> </table> | Histórico vacinal | Conduta na gestação | Previamente vacinada, com pelo menos três doses de vacina contendo o componente tetânico. | Uma dose de dTpa a partir da 20ª semana de gestação. | Em gestantes com vacinação incompleta tendo recebido uma dose de vacina contendo o componente tetânico. | Uma dose de dT e uma dose de dTpa, sendo que a dTpa deve ser aplicada a partir da 20ª semana de gestação. Respeitar intervalo mínimo de um mês entre elas. | Em gestantes com vacinação incompleta tendo recebido duas doses de vacina contendo o componente tetânico. | Uma dose de dTpa a partir da 20ª semana de gestação. | Em gestantes não vacinadas e/ou histórico vacinal desconhecido. | Duas doses de dT e uma dose de dTpa, sendo que a dTpa deve ser aplicada a partir da 20ª semana de gestação. Respeitar intervalo mínimo de um mês entre elas. | <ul style="list-style-type: none"> A dTpa está recomendada em todas as gestações, pois além de proteger a gestante e evitar que ela transmita a <i>Bordetella pertussis</i> ao recém-nascido, permite a transferência de anticorpos ao feto protegendo-o nos primeiros meses de vida até que possa ser imunizado. Mulheres não vacinadas na gestação devem ser vacinadas no puerpério, o mais precocemente possível. Na indisponibilidade de dTpa, pode-se substituí-la pela dTpa-VIP, ficando a critério médico o uso <i>off label</i> em gestantes. | SIM, dT e dTpa | SIM, dTpa e dTpa-VIP |
| Histórico vacinal | Conduta na gestação | | | | | | | | | | | | | |
| Previamente vacinada, com pelo menos três doses de vacina contendo o componente tetânico. | Uma dose de dTpa a partir da 20ª semana de gestação. | | | | | | | | | | | | | |
| Em gestantes com vacinação incompleta tendo recebido uma dose de vacina contendo o componente tetânico. | Uma dose de dT e uma dose de dTpa, sendo que a dTpa deve ser aplicada a partir da 20ª semana de gestação. Respeitar intervalo mínimo de um mês entre elas. | | | | | | | | | | | | | |
| Em gestantes com vacinação incompleta tendo recebido duas doses de vacina contendo o componente tetânico. | Uma dose de dTpa a partir da 20ª semana de gestação. | | | | | | | | | | | | | |
| Em gestantes não vacinadas e/ou histórico vacinal desconhecido. | Duas doses de dT e uma dose de dTpa, sendo que a dTpa deve ser aplicada a partir da 20ª semana de gestação. Respeitar intervalo mínimo de um mês entre elas. | | | | | | | | | | | | | |
| Tríplice bacteriana acelular do tipo adulto (difteria, tétano e coqueluche) – dTpa ou dTpa-VIP | | | | | | | | | | | | | | |
| Dupla adulto (difteria e tétano) – dT | | | | | | | | | | | | | | |
| Hepatite B | Três doses, no esquema 0 - 1 - 6 meses. | A vacina hepatite B deve ser aplicada em gestantes não anteriormente vacinadas e suscetíveis à infecção. | SIM | SIM | | | | | | | | | | |
| Influenza (gripe) | Dose única anual. | A gestante é grupo de risco para as complicações da infecção pelo vírus influenza. A vacina está recomendada nos meses da sazonalidade do vírus, mesmo no primeiro trimestre de gestação. Desde que disponível, a vacina influenza 4V é preferível à vacina influenza 3V, por conferir maior cobertura das cepas circulantes. Na impossibilidade de uso da vacina 4V, utilizar a vacina 3V. | SIM, 3V | SIM, 3V e 4V | | | | | | | | | | |
| RECOMENDADAS EM SITUAÇÕES ESPECIAIS | | | | | | | | | | | | | | |
| Hepatite A | Dois doses, no esquema 0 - 6 meses. | É vacina inativada, portanto sem risco teórico para a gestante e o feto. Já que no Brasil as situações de risco de exposição ao VHA são frequentes, a vacinação deve ser considerada. | NÃO | SIM | | | | | | | | | | |
| Hepatite A e B | Para menores de 16 anos: duas doses, aos 0 - 6 meses. A partir de 16 anos: três doses, aos 0 - 1 - 6 meses. | A vacina combinada é uma opção e pode substituir a vacinação isolada das hepatites A e B. | NÃO | SIM | | | | | | | | | | |
| Pneumocócicas | Esquema sequencial de VPC13 e VPP23 pode ser feito em gestantes de risco para doença pneumocócica invasiva (DPI) (consulte os Calendários de vacinação SBIm pacientes especiais). | <ul style="list-style-type: none"> VPC13 e VPP23 são vacinas inativadas, portanto sem riscos teóricos para a gestante e o feto. | NÃO | SIM | | | | | | | | | | |
| Meningocócicas conjugadas ACWY/C | Uma dose. Considerar seu uso avaliando a situação epidemiológica e/ou a presença de comorbidades consideradas de risco para a doença meningocócica (consulte os Calendários de vacinação SBIm pacientes especiais). | <ul style="list-style-type: none"> As vacinas meningocócicas conjugadas são inativadas, portanto sem risco teórico para a gestante e o feto. Na indisponibilidade da vacina meningocócica conjugada ACWY, substituir pela vacina meningocócica C conjugada. | NÃO | SIM | | | | | | | | | | |
| Meningocócica B | Dois doses com intervalo de um a dois meses. Considerar seu uso avaliando a situação epidemiológica e/ou a presença de comorbidades consideradas de risco para a doença meningocócica (consulte os Calendários de vacinação SBIm pacientes especiais). | A vacina meningocócica B é inativada, portanto sem risco teórico para a gestante e o feto. | NÃO | SIM | | | | | | | | | | |
| Febre amarela | Normalmente contraindicada em gestantes. Porém, em situações em que o risco da infecção supera os riscos potenciais da vacinação, pode ser feita durante a gravidez. Dose única. Não há consenso sobre a duração da proteção conferida pela vacina. De acordo com o risco epidemiológico, uma segunda dose pode ser considerada pela possibilidade de falha vacinal. | <ul style="list-style-type: none"> Gestantes que viajam para países que exigem o Certificado Internacional de Vacinação e Profilaxia (CIVP) devem ser isentadas da vacinação pelo médico assistente, se não houver risco de contrair a infecção. É contraindicada em nutrízes até que o bebê complete 6 meses; se a vacinação não puder ser evitada, suspender o aleitamento materno por dez dias. | SIM | SIM | | | | | | | | | | |
| CONTRAINDICADAS | | | | | | | | | | | | | | |
| Tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola) | Não vacinar na gestação. | <ul style="list-style-type: none"> Pode ser aplicada no puerpério e durante a amamentação. | SIM, para puérperas de até 59 anos | SIM, para puérperas | | | | | | | | | | |
| HPV | Não vacinar na gestação. Se a mulher tiver iniciado esquema antes da gestação, suspendê-lo até puerpério. | <ul style="list-style-type: none"> Pode ser aplicada no puerpério e durante a amamentação. | NÃO | SIM, para puérperas | | | | | | | | | | |
| Varicela (catapora) | Não vacinar na gestação. | <ul style="list-style-type: none"> Pode ser aplicada no puerpério e durante a amamentação. | NÃO | SIM, para puérperas | | | | | | | | | | |
| Dengue | Não vacinar na gestação. | <ul style="list-style-type: none"> A vacina é contraindicada em mulheres soronegativas; que estejam amamentando e imunodeprimidas. | NÃO | NÃO | | | | | | | | | | |